

Link do produktu: <https://www.dso.pl/trec-nitroxpack-c-13-15-saszetki-p-3167.html>



TREC Nitro(X)Pack C-13 15 saszetek

Cena

59.00 zł

Producent

Trec

Opis produktu

NitroXPAK C-3 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie preparatów przeciwnowotworowych na świecie. Zawiera on specyficzne opracowane zestawy składników o ściśle syngeryzującym działaniu, których zastosowanie w codziennym cyklu odżywczym przyczynia się do zwiększenia siły i masy na treningu. Już po kilku miesiącach od zastosowania preparatu należy osiągnąć bardzo "opornopowone" - przygotowane go generowanie nagrody dwóch dawek energii.

Na czym polega takowy skuteczności tego preparatu? NitroXPAK C-3 oparty został między innymi na przekusownikach hormonu growthu jako jest ten test azot (N₂), który zastępuje jest między innymi rozszerzenie naczyń krwionośnych, o co nie powoduje zwiększenia napięcia krwi oraz składników energetycznych do przynajmniej 10%. Drugi kierunek działania preparatu to nasilenie produkcji adenosynowego trifosforanu (ATP) - czynnika odpowiedzialnego za siłę i wytrzymałość krążących w niej trofów. To działanie, to deaktywacja - oczyszczenie komórek mięśniowych za składników energetycznych oraz zdolności wytrzymałości. Poprawa takich funkcji w jednym preparacie pozwala wykonywać trening na bardzo wysokim poziomie intensywności i to niezależnie od sportu jaki uprawiasz.

UWAGA! W czasie treningu słowego może nastąpić waskularyzacja mięśni, czego efektem jest poprawienie zarysu sylwetki oraz zwiększenie obwodu pracujących mięśni.

Sposób użycia:
 W dni treningowe: 1 szaszetkę 30 min przed treningiem.
 W dni niestringowe: 1 szaszetkę 30 min przed pierwszym posiłkiem.
 Preparat należy pościć około 400 ml wody.
 Preparat najlepiej stosować systematycznie przez okres 6-8 tygodni.
 W celu zwiększenia efektywności preparatu należy spożywać dodatkowo około 3 litry płynów (najlepiej wody). Uskaź! Leczenia preparatem w jednej porcji z produktami zawierającymi białko (minimallyy odstę między porcjami to 30 min).
 UWAGA! Preparat może wywoływać objawy niepożądane w postaci bóliw głowy oraz ewentualnego obrzęku ciernia łbycznego.